
2 임상병리사 국가시험 샘플문항

1. 심전도 검사 시 II유도에서 아래와 같이 기록되었다. 대처방법으로 가장 옳은 것은?



1) 왼손에 힘을 빼고 움직이지 않도록 한다.
2) 오른손에 힘을 빼고 움직이지 않도록 한다.
3) 왼발전극을 피부와 다시 잘 접촉시킨다.
4) 왼손전극을 피부와 다시 잘 접촉시킨다.
5) 오른손전극을 피부와 다시 잘 접촉시킨다.

2. 원인이 확실치 않은 재발성 실신을 호소하는 환자에게 혈관미주신경성 실신(vasovagal syncope)을 진단하기 위해 실시하는 검사는?
1) 청각 검사
2) 후각 검사
3) 시각유발 검사
4) 평형기능 검사
5) 기립경사도 검사

3. 적혈구용적치가 55% 이상인 진성적혈구증가증 환자로부터 응고검사에 필요한 혈액을 채취하고자 한다. 항응고제로 sodium citrate가 들어있는 튜브에 채혈하고자 할 경우 올바른 방법은?
1) 그대로 사용한다.
2) 항응고제 양을 줄인다.
3) 항응고제 양을 늘린다.
4) 항응고제를 EDTA로 바꾼다.
5) 항응고제를 heparin으로 바꾼다.